

An Investigation of the Relationship between PPP1R3 Gene Polymorphism and Type 2 Diabetes

Soyar Sari^{1*}, Golnar Sari²

¹Department of Cellular & Molecular Sciences, Faculty of Advanced Sciences & Technology, Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

²Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

*Corresponding Author:
Soyar Sari, Department of Cellular & Molecular Sciences, Faculty of Advanced Sciences & Technology, Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Email:
sari.s@iaups.ac.ir

Received: 30 May, 2016

Accepted: 24 Jul, 2016

Abstract

Background and Objectives: *PPP1R3* is one of the genes confirmed to be associated with type 2 diabetes. This gene is located on the long arm of chromosome 7 and encodes protein phosphatase 1 (PP1), which has serine/threonine phosphatase activity. There is a polymorphic region in the 3'UTR region of this gene, which creates ARE1 and ARE2 alleles. The aim of this study was to determine the relationship between *PPP1R3* gene polymorphism and type 2 diabetes.

Methods: In this case-control study, 100 patients with type 2 diabetes and 100 healthy individuals, were randomly selected from the study population. *PPP1R3* gene polymorphism was analyzed using PCR-RFLP method. Comparison of variables between healthy and patient groups, was performed by t-test, allele frequency by counting, and calculation of their ratio by chi-square test, and the population was confirmed to be in Hardy-Weinberg equilibrium. Distribution of genotypes and alleles was compared between healthy and patient groups.

Results: In this study, there was no significant difference between the frequency of genotypes and frequency of alleles in subjects with type 2 diabetes and healthy control subjects.

Conclusion: The findings of this study indicated that polymorphisms in the 3'UTR region of *PPP1R3* gene is not associated with type 2 diabetes.

Keywords: Polymorphism, Genetics; Diabetes mellitus; Type 2; Protein phosphatase 1.

بررسی رابطه پلی مورفیسم ژن PPP1R3 با دیابت نوع ۲

سویار ساری^{۱*}، گلنار ساری^۲

چکیده

زمینه و هدف: یکی از ژن‌هایی که اخیراً ارتباط آن با بیماری دیابت نوع ۲ تأیید شده، ژن PPP1R3 می‌باشد. این ژن روی بازوی بلند کروموزوم ۷ قرار دارد و رمزگذار پروتئین فسفاتاز ۱ (PP1) بوده که دارای فعالیت سرین/ترئونین فسفاتاز است. در ناحیه 3'UTR این ژن، یک ناحیه پلی مورفیک وجود دارد که موجب ایجاد دو آلل ARE1, ARE2 می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن PPP1R3 با دیابت نوع ۲ انجام شد.

روش بررسی: در این پژوهش مورد - شاهدهی، ۱۰۰ بیمار دیابتی نوع ۲ و ۱۰۰ فرد سالم، به‌طور تصادفی از جمعیت مورد مطالعه انتخاب شدند. پلی مورفیسم ژن PPP1R3، با استفاده از روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه متغیرها بین گروه سالم و بیمار با استفاده از آزمون تی تست، فراوانی آلل با شمارش و محاسبه نسبت آنها با آزمون کای دو و قرارگیری جامعه در تعادل هاردی - واینبرگ تأیید گردید. توزیع ژنوتیپ‌ها و آلل‌های مختلف در هر دو گروه سالم و بیمار با هم مقایسه شدند.

یافته‌ها: در این مطالعه، تفاوت معنی‌داری بین فراوانی ژنوتیپ‌ها و فراوانی آلل‌ها در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ و افراد کنترل سالم مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد پلی مورفیسم در منطقه 3'UTR ژن PPP1R3 با دیابت نوع ۲، ارتباطی ندارد.

کلید واژه‌ها: پلی مورفیسم، ژنتیک؛ دیابت ملیتوس، نوع ۲، پروتئین فسفاتاز ۱.

گروه آموزشی علوم سلولی مولکولی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول مکاتبات:

سویار ساری، گروه آموزشی علوم سلولی مولکولی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛

آدرس پست الکترونیکی:

sari.s@iaups.ac.ir

تاریخ دریافت: ۹۵/۳/۹

تاریخ پذیرش: ۹۵/۴/۳

لطفاً به این مقاله به‌صورت زیر استناد نمایید:

Sari S, Sari G. An investigation of the relationship between ppp1r3 gene polymorphism and type 2 diabetes.

Qom Univ Med Sci J 2017;11(5):9-15. [Full Text in Persian]

مقدمه

دیابت نوع ۲، شایع‌ترین بیماری متابولیک است؛ به طوری که تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا خواهند شد (۱). این بیماری، یک اختلال مزمن و پیشرونده است که ناشی از مقاومت به انسولین در بافت‌های محیطی بدن نظیر عضلات، کبد و بافت چربی همراه با نقص نسبی در ترشح انسولین می‌باشد (۲،۳). در شرایط عادی، قندخون به وسیله سلول‌های آلفا و بتای جزایر لانگرهانس پانکراس کنترل می‌شود. هنگامی که افزایشی در گلوکز خون اتفاق می‌افتد، این سلول‌ها گلوکز را از طریق ناقل غشایی گلوکز در غشا (GLUT2) به داخل سلول منتقل کرده و باعث افزایش متابولیسم آن در داخل سلول می‌شوند (۴). افزایش متابولیسم داخل سلولی گلوکز موجب بالارفتن فعالیت زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری و افزایش سطح ATP داخل سلولی می‌گردد. همچنین بالارفتن سطح ATP داخل سلولی باعث بسته شدن کانال‌های پتاسیم وابسته به ATP غشای سلولی، القای دیپولاریزاسیون غشا و ورود کلسیم به داخل سلول شده که در نهایت، این فعل و انفعالات موجب تحریک ترشح انسولین و در پی آن، افزایش ورود گلوکز به عنوان تنها منبع کسب انرژی به داخل سلول می‌شود (۵،۶). پروتئین فسفاتاز ۱ (PP1) دارای فعالیت سرین/ترئونین فسفاتاز بوده و در متابولیسم گلیکوژن، تمایز و تکثیر سلول نقش دارد. نتایج تحقیقات اخیر نشان داده است تا سال ۲۰۱۱، بیش از ۳۶ ژن کاندید از قبیل PPP1R3 (پروتئین فسفاتاز ۱ زیرواحد تنظیمی 3) در مستعد شدن افراد به دیابت نوع ۲ دخیل بوده‌اند. اما اجماع نظر واضحی از سوی همه دانشمندان در مورد ژن خاصی که به طور دقیق با فنوتیپ شناخته شده دیابت مرتبط باشد وجود ندارد (۷،۸). ژن PPP1R3 روی بازوی بلند کروموزوم ۷ قرار گرفته و در ناحیه 3'UTR آن یک ناحیه پلی مورفیک وجود دارد که پلی مورفیسم در این ناحیه باعث ایجاد آلل‌های ARE1, ARE2 می‌گردد. این ژن در همه بافت‌های بدن بیان می‌شود (۹)، و بیشترین سطح بیان آن در قلب و ماهیچه اسکلتی مشاهده شده است (۱۰). مطالعات اخیر، نقش ژن PPP1R3 را در متابولیسم گلوکز نشان داده است؛ به طوری که کاهش فعالیت این ژن، به طور قابل توجهی باعث اختلال در توانایی سلول‌های بتای پانکراس در گرفتن گلوکز

می‌شود. موتاسیون‌ها و یا چندشکلی‌های ژنتیکی در منطقه 3'UTR ژن PPP1R3 می‌توانند باعث کاهش بیان پروتئین فسفاتاز ۱ شوند و سنتز گلیکوژن را مختل و زمینه را برای ایجاد بیماری دیابت فراهم کنند (۱۱،۱۲). اهمیت این بررسی و توجه به پلی مورفیسم ژن PPP1R3 از یک سو (معطوف به نقش مهم آن در ایجاد سرطان‌های کولون تخمدان، کبد و ارتباط آن با بیماری دیابت نوع ۲) و از سوی دیگر، عدم وجود مطالعاتی همانند تحقیق حاضر درخصوص ارتباط این پلی مورفیسم با بیماری دیابت نوع ۲ در کشور، ضرورت انجام این تحقیق را افزون کرده است. لذا در مطالعه حاضر به بررسی رابطه پلی مورفیسم ژن PPP1R3 با دیابت نوع ۲ پرداخته شد.

روش بررسی

این مطالعه مورد - شاهدی بر روی ۱۰۰ بیمار دیابتی نوع ۲ و ۱۰۰ نمونه فرد سالم به عنوان گروه کنترل انجام شد. قابل ذکر است انتخاب این تعداد نمونه، براساس امکانات و دسترسی محدود به نمونه‌ها بود و هر کدام از افراد بیمار و سالم از نظر ژنتیکی یکسان بودند.

نمونه‌ها از هر دو گروه بیمار و سالم از نظر جنسیت، ۶۳٪ زن و مابقی مرد و در میانگین سنی ۶۱ سال قرار داشتند. اکثر بیماران و افراد سالم، متأهل و از نظر سطح تحصیلات، بیسواد تا مقطع دکتری بودند. در افراد بیمار؛ کمترین زمان مدت ابتلا، یک سال و بیشترین زمان، ۳۰ سال گزارش شد. افراد دیابتی از مراجعه کنندگان به کلینیک‌های دیابت و گروه کنترل از افراد سالم که معیارهای ابتلای به دیابت و سابقه فامیلی دیابت در اقوام درجه اول و دوم را نداشتند، به طور تصادفی انتخاب شدند. ابتلا به دیابت با معیارهای سازمان بهداشت جهانی (WHO)، به صورت قند خون ناشتا (FBS)، بالاتر از ۱۲۶ میلی گرم بردهی لیتر یا قند دوساعته پس از مصرف گلوکز (OGTT) بیشتر از ۲۰۰ میلی گرم بردهی لیتر و یا مصرف داروی ضد دیابت به تجویز پزشک تعریف شده است (۱۳). نمونه‌گیری با دادن آگاهی لازم و رضایت‌نامه کتبی از افراد انجام گرفت. پس از ۱۲ ساعت گرسنگی شبانه، از افراد تحت مطالعه، خونگیری به عمل آمد و سپس مقدار تری گلیسرید (TG)، قند خون ناشتا (FBS)، هموگلوبین

محصول هضم بر روی ژل اکریل آمید ۱۰٪، الکتروفورز و با اتیدیوم بروماید، رنگ آمیزی و آلل‌ها به صورت باند ۱۱۰ (آلل ARE1) و یا ۱۰۵ (آلل ARE2) مشاهده شدند (افراد با ژنوتیپ ARE1/ARE1 دارای یک باند ۱۱۰، افراد با ژنوتیپ ARE2/ARE2 دارای یک باند به اندازه ۱۰۵ و افراد با ژنوتیپ ARE1/ARE2 دارای دو باند به اندازه‌های ۱۱۰ و ۱۰۵ می‌باشند). متغیرهای کمی به صورت میانگین \pm انحراف معیار و متغیرهای کیفی براساس درصد بیان شدند. مقایسه متغیرها بین گروه سالم و بیمار با استفاده از آزمون تی تست و فراوانی آلل با شمارش و محاسبه نسبت آنها با آزمون کای دو و قرارگیری جامعه در تعادل هاردی - واینبرگ تأیید گردید. توزیع ژنوتیپ‌ها و آلل‌های مختلف در هر دو گروه سالم و بیمار با هم مقایسه شدند.

یافته‌ها

در این مطالعه، گروه سالم و دیابتی از نظر سنی در یک رده قرار داشتند و اختلاف فراوانی نمونه‌های زن و مرد بین دو گروه معنی‌دار نبود. میانگین مقادیر FBS ($p < 0/001$)، TG ($p < 0/005$) و HbA1c ($p < 0/05$) در بیماران دیابتی، به طور معنی‌داری بیشتر از افراد سالم بود. اختلاف معنی‌داری در میزان کلسترول بین دو گروه مشاهده نشد (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: توزیع متغیرهای بالینی و بیوشیمیایی در بیماران دیابتی و افراد سالم	
افراد سالم	افراد دیابتی
۵۰±۳	۵۸±۳
سن (سال)	سن (سال)
۴۳(٪۴۳)	۵۱(٪۵۱)
جنسیت (مرد/زن)	جنسیت (مرد/زن)
۷۰±۱۰/۳*	۲۴۳±۴۲
کلسترول (میلی گرم بردسی لیتر)	کلسترول (میلی گرم بردسی لیتر)
۱۷۰/۷±۲۳	۱۶۳±۴۵
تری گلیسرید (میلی گرم بردسی لیتر)	تری گلیسرید (میلی گرم بردسی لیتر)
۱۸۵±۵۶	۲۱۳±۲۱
هموگلوبین گلیکوزیله (درصد)	هموگلوبین گلیکوزیله (درصد)
۵±۱/۹*	۸/۴±۱/۲

از آزمون تی تست (برای مقایسه متغیرهای کمی بین گروه کنترل و دیابتی) استفاده گردید. متغیرهای دارای اختلاف معنی‌دار، $p < 0/05$ با علامت * مشخص شده‌اند. در سایر متغیرها بین گروه کنترل و دیابتی، اختلاف معنی‌داری در $p < 0/05$ مشاهده نشده است.

مقایسه فراوانی ژنوتیپ‌ها و آلل‌ها بین دو گروه بیمار و سالم با آزمون کای دو و قرارگیری در تعادل هاردی - واینبرگ انجام گرفت. مقایسه فراوانی ژنوتیپ‌ها و آلل‌ها در بین دو گروه تحت مطالعه، تفاوت معنی‌داری نداشتند.

گلیکوزیله (HbA1c) و کلسترول سرم با روش‌های استاندارد آزمایشگاهی اندازه‌گیری شد.

برای هر فرد بیمار و سالم، DNA ژنومی با استفاده از روش فنل - کلروفرم استخراج گردید. پلی مورفیسم ژن PPP1R3 به وسیله PCR و هضم آنزیم محدودگر MseI مشخص شد. واکنش PCR در حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر، حاوی ۱۲/۵ میکرولیتر Master mix PCR، ۲ میکرولیتر از هر پرایمر پیشرو 5'TAGGTATTTGTAATGTACGTGTA 3' و پرایمر پیرو 5'GTAAGTGCATTCTCTACAGCAA 3' و ۲ میکرولیتر از DNA الگو صورت گرفت (۱۴، ۱۵).

برنامه واکنش PCR بدین صورت انجام شد:

۹۵ درجه به مدت ۵ دقیقه، ۳۵ سیکل شامل ۹۴ درجه به مدت ۳۵ ثانیه (جهت اتصال پرایمر به رشته الگو)، ۷۲ درجه به مدت ۳۰ ثانیه (جهت طویل شدن) و در نهایت، پس از اتمام ۳۵ سیکل، مخلوط واکنش به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۷۲ درجه باقی ماند تا عمل طویل شدن نهایی انجام شد. محصول PCR بر روی ژل آگارز ۱/۵٪ مشاهده گردید. ۵ میکرولیتر از محصول PCR به وسیله آنزیم MseI در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد هضم شد.

فراوانی ژنوتیپ‌ها در هر دو گروه دارای تعادل هاردی - واینبرگ بود. درصد شیوع ژنوتیپ‌های ARE1/ARE2، ARE1/ARE1، ARE2/ARE2، در افراد سالم به ترتیب ۵۲/۷٪، ۱۳/۴٪ و ۳۳/۹٪ و در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ به ترتیب ۴۹/۷٪، ۱۲/۳٪ و ۳۸٪ گزارش شد (جدول شماره ۲).

و در بیماران حامل آلل ARE1 (ARE1/ARE1, ARE1/ARE2) نسبت به افراد فاقد آلل ARE1 (OR=۰/۵۲ و CI=۰/۵۲-۱/۹) مشاهده نشد.

تفاوت معنی داری در احتمال ابتلا به دیابت نوع ۲ برای افراد حامل آلل ARE2 (ARE2/ARE2, ARE1/ARE2) نسبت به افراد فاقد آلل ARE2 (ARE2/ARE2) (OR=۰/۵۸ و CI=۰/۳۱۴-۱/۱۸۳) مشاهده نشد.

جدول شماره ۲: فراوانی ژنوتیپ‌ها و آلل‌ها در افراد سالم و دیابتی

ژنوتیپ	گروه افراد دیابتی تعداد (درصد)	گروه افراد سالم تعداد (درصد)
ARE2/ARE2	۱۲/۳ (۱۲/۳)	۱۳/۴ (۱۳/۴)
ARE1/ARE2	۳۸ (۳۸)	۳۳/۹ (۳۳/۹)
ARE1/ARE1	۴۹/۷ (۴۹/۷)	۵۲/۷ (۵۲/۷)
حاملین آلل ARE2 حضور آلل ARE2	۵۰/۳ (۵۰/۳)	۴۷/۳ (۴۷/۳)
غیاب آلل ARE2	۴۹/۷ (۴۹/۷)	۵۲/۷ (۵۲/۷)

سطح بیان بعضی هورمون‌ها از جمله انسولین موجب تغییر در میزان خطر ابتلای به بیماری می‌شوند. همچنین تفاوت در نتایج حاصل از این مطالعات می‌تواند مربوط به اختلاف نژادی باشد. ممکن است فاکتوری که در یک منطقه و در یک نژاد مشخص، عامل مستعد کننده برای ابتلای به بیماری خاص است، در نژاد دیگر و در منطقه جغرافیایی متفاوت، تعیین کننده نباشد (۲۱، ۲۲). به عبارتی، ارتباط و همراهی ژنتیکی وابسته به جمعیت می‌تواند در جوامع مختلف، نتایج متفاوتی نشان دهد. این مطالعه گزارشی برای قبول و یا رد ارتباط بین پلی مورفیسم ژن PPP1R3 و خطر ابتلای به دیابت نوع ۲ بوده که در علم پزشکی برای تعیین ژنوتیپ افراد و بررسی پرخطر بودن آنها برای ابتلای به دیابت کاربرد دارد.

نتیجه گیری

از آنجا که در این مطالعه، ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم ژن PPP1R3 و خطر ابتلای به دیابت نوع ۲ یافت نشد، با مطالعات بیشتر جهت قبول یا رد این نتیجه می‌توان به نتایج جامع‌تری در غربالگری دست یافت. برای رسیدن به نتایج جامع، انجام مطالعه مشابه با تعداد نمونه بیشتر و بررسی رژیم غذایی، وزن بیماران، سابقه خانوادگی و سبک زندگی در افراد تحت مطالعه پیشنهاد می‌گردد.

فراوانی ژنوتیپ‌ها در هر دو گروه، دارای تعادل هاردی - واینبرگ بود. درصد شیوع ژنوتیپ‌های ARE1/ARE1, ARE2/ARE2, ARE1/ARE2 در افراد سالم به ترتیب ۱۳/۴٪ و ۳۳/۹٪ و در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ به ترتیب ۴۹/۷٪، ۱۲/۳٪ و ۳۸٪ گزارش شد.

بحث

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد پلی مورفیسم ژن PPP1R3، با خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ مرتبط نمی‌باشد. تاکنون چندین پلی مورفیسم در ژن PPP1R3 مشخص شده و ارتباط آنها با بیماری‌هایی از قبیل دیابت، چاقی و...، در بعضی از جمعیت‌های مورد مطالعه به اثبات رسیده است (۱۹-۱۶). در مطالعه حاضر، فراوانی آلل ARE1, ARE2 بین دو گروه بیمار و سالم، تفاوت معنی داری نشان نداد. تحقیقات درخصوص بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن PPP1R3 با دیابت نوع ۲ محدود است. Cheema و همکاران در مطالعه‌ای در آفریقا (سال ۲۰۱۵) گزارش کردند واریانت‌های ARE1, ARE2 در ژن PPP1R3 با افزایش خطر ابتلای به دیابت ارتباط دارد (۲۰). اختلاف در یافته‌های مطالعه مشابه با پژوهش حاضر می‌تواند به علت وجود پلی مورفیسم در ژن‌های دخیل در مسیرهای مشابه متابولیکی باشد. فاکتورهای دیگری از قبیل عوامل محیطی به عنوان عوامل مداخله گر روی

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همکاری تمامی بیماران و افراد سالم داوطلب شرکت کننده در این مطالعه به دلیل همکاری های لازم قدردانی می گردد.

مطالعه حاضر نتیجه طرح تحقیقاتی یا پایان نامه نبوده است و حاصل حمایت مالی نویسندگان می باشد.

References:

- Nolan C, Damm P, Prentki M. Type 2 diabetes across generations from pathophysiology to prevention and management. *Lancet* 2011;378(9786):169-81.
- Saini V. Molecular mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes mellitus. *World J Diabetes*. 2010;1(3):68-75.
- DeFronzo RA, Eldor R, Abdul-Ghani M. Pathophysiologic approach to therapy in patients with newly diagnosed type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2013;36(2):127-38.
- Leturque A, Brotlaroche E, Legall M. GLUT2 mutations translocation and receptor function in diet sugar managing. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2009;296(5):985-92.
- Bao W, Hu FB, Rong S, Rong Y, Bowers K, Schisterman EF, et al. Predicting risk of type 2 diabetes mellitus with genetic risk models on the basis of established genome-wide association markers: a systematic review. *Am J Epidemiol* 2013;178(8):1197-207.
- Henquin JC. Regulation of insulin secretion a matter of phase control and amplitude modulation. *Diabetologia* 2009;52(5):739-51.
- Pagliuca F, Millman J, Gurtler M, Segel M, Dervort A, Hyojeryu J, et al. Generation of functional human pancreatic B cells invitro. *Cell* 2014;159(2):428-39.
- Saaristo T, Moilanen L, Korpi.E, Vanhala M, Saltevo J, Niskanen L, et al. Lifestyle intervention for prevention of type 2 diabetes in primary health care. *Diabetes Care* 2010;33(10):2146-51.
- Hayashida Y, Goi T, Hirono Y, Katayama K, Urano T, Yamaguchi A. PPP1R3 gene (protein phosphatase 1) alterations in colorectal cancer and its relationship to metastasis. *Oncol Rep* 2005;13(6):1223-7.
- Savage DB, Zhai L, Ravikumar B, Choi CS, Snaar JE, McGuire AC, et al. A prevalent variant in PPP1R3A impairs glycogen synthesis and reduces muscle glycogen content in humans and mice. *Plos Med* 2008;5(1):27.
- Peng A, Lewellyn AL, Schiemann WP, Maller JL. Repo-man controls a protein phosphatase 1-dependent threshold for DNA damage checkpoint activation. *Curr Biol* 2010;20(5):387-96.
- Paterson J, Kelsall IR, Cohen P. Disruption of the striated muscle glycogen-targeting subunit of protein phosphatase 1: influence of the genetic background. *J Mol Endocrinol* 2008;40:47-59.
- Alberti KG, Zimmet PZ. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1 diagnosis and classification of diabetes mellitus provisional report of a WHO consultation. *Diabet Med* 1998;15(7):539-53.
- Xue Sun, Weihui Yu, Cheng Hu. Genetics of Type 2 Diabetes: Insights into the pathogenesis and its clinical application. *Bio Med Res Int* 2014;2014(2014):1-16.
- Chowdhury R, Narayan KM, Zabetian A, Raj S, Tabassum R. Genetic studies of type 2 diabetes in South Asians: A systematic overview. *Curr Diabets Rev* 2014;10(4):258-74.
- Hunter RW1, Treebak JT, Wojtaszewski JF, Sakamoto K Molecular mechanism by which AMP-activated protein kinase activation promotes glycogen accumulation in muscle. *Diabetes* 2011;60(3):766-74.

17. Doney A, Fischer B, Cecil J, Cohen P, Boyle D, Leese G, et al. Male preponderance in early diagnosed type 2 diabetes is associated with the ARE insertion/deletion polymorphism in the PPP1R3A locus. *BMC Genetics* 2003;4(11):1-7.
18. Tallapragada D, Bhaskar S, G Chandak. New insights from monogenic diabetes for “common” type 2 diabetes. *Front Genet* 2015;6(251):1-15.
19. Robertiani A Scott, Tove Fall, Dorota Pasko, Adam Barker, Stephen J Sharp, Larraitz Arriola, et al. Common genetic variants highlight the role of insulin resistance and body fat distribution in type 2 diabetes, independently of obesity. *Diabetes* 2014;63(12):4378-87.
20. Cheema AK, Li T, Liuzzi J, Zarini G, Dorak M, Huffman F. Genetic Associations of PPARGC1A with Type 2 Diabetes: Differences among Populations with African Origins. *J Diabetes Res* 2015;2015(2015):1-10.
21. Richter E, Hargreaves M. Exercise, GLUT4 and skeletal muscle glucose uptake. *Physiol Rev* 2013;93(3):993-1017.
22. Ghayori B, Rashki A, Motaleb G, Dahmardeei M. Association of pink1 gene polymorphism Ala340Thr with Type 2 Diabetes in sistan and Baluchistan province. *Sci J Ilam Univ Med Sci* 2015,23(1):127-133. [Full Text in Persian]